

## TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art.6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n.117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 2 ottobre 2007, n.160)

**LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO**

CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE (G/L)	SENSAZIONI PIÙ FREQUENTI (*)	EFFETTI PROGRESSIVI E ABILITÀ COMPROMESSE (*)
0	Nessuna	Nessuna
0,1 - 0,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniziale sensazione di ebbrezza.</li> <li>• Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo.</li> <li>• Iniziale riduzione del coordinamento motorio.</li> <li>• Iniziale riduzione della visione laterale.</li> <li>• Nausea.</li> </ul>
0,3 - 0,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensazione di ebbrezza.</li> <li>• Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo.</li> <li>• Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi.</li> <li>• Riduzione della visione laterale.</li> <li>• Vomito.</li> </ul>

### 0,5 G/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

0,5 - 0,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiamenti dell'umore.</li> <li>• Nausea, sonnolenza.</li> <li>• Stato di eccitazione emotiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione della capacità di giudizio.</li> <li>• Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale.</li> <li>• Riflessi alterati.</li> <li>• Alterazione della capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi.</li> <li>• Vomito.</li> </ul>
0,9 - 1,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione dell'umore.</li> <li>• Rabbia.</li> <li>• Tristezza.</li> <li>• Confusione mentale, disorientamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.</li> <li>• Comportamenti socialmente inadeguati.</li> <li>• Linguaggio mal articolato.</li> <li>• Alterazione dell'equilibrio.</li> <li>• Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni.</li> <li>• Vomito.</li> </ul>
1,6 - 3,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stordimento.</li> <li>• Aggressività.</li> <li>• Stato depressivo.</li> <li>• Apatia.</li> <li>• Letargia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compromissione grave dello stato psicofisico.</li> <li>• Comportamenti aggressivi e violenti.</li> <li>• Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare.</li> <li>• Stato di inerzia generale.</li> <li>• Ipotermia.</li> <li>• Vomito.</li> </ul>
3,1 - 4,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato di incoscienza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allucinazioni.</li> <li>• Cessazione dei riflessi.</li> <li>• Incontinenza.</li> <li>• Vomito.</li> <li>• Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.</li> </ul>
Oltre 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento.</li> <li>• Sensazione di morire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battito cardiaco rallentato.</li> <li>• Fame d'aria.</li> <li>• Coma.</li> <li>• Morte per arresto respiratorio.</li> </ul>

Fonte: riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(\*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

